



HPV VACCINE

วัคซีนเอชพีวี หรือ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก



มะเร็งปากมดลูก

จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกจัดอยู่ในอันดับ 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในหญิงไทย โดยเกือบ 100% มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส HPV


ไวรัส HPV สามารถก่อโรคได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งอวัยวะเพศชาย มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องปากและลำคอ

ชนิดวัคซีน HPV

HPV vaccine	ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์	
	ความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง	ความเสี่ยงต่ำที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
ชนิด 2 สายพันธุ์	16,18	-
ชนิด 4 สายพันธุ์	16,18	6, 11 (หูดหงอนไก่)
ชนิด 9 สายพันธุ์	16, 18, 31, 33, 45, 52, 58	6, 11 (หูดหงอนไก่)

วัคซีน HPV ต้องฉีดให้ครบถ้วนทั้งหมด 3 ครั้ง

หากฉีดเข็มแรกก่อนอายุ 15 ปี สามารถฉีดวัคซีนเพียง 2 ครั้ง ห่างกัน 6 - 12 เดือน



1

ครั้งที่ 1
กำหนดวันได้เอง

2

ครั้งที่ 2
หลังจากเข็มแรก
1 - 2 เดือน

3

ครั้งที่ 3
หลังจากเข็มแรก
6 เดือน

กลุ่มเป้าหมาย


หญิงและชาย
อายุ 9 - 26 ปี

โดยเน้นให้ฉีด
ช่วงอายุ 11 - 12 ปี

หากฉีดในวัยที่
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
จะมีประสิทธิภาพสูง

ข้อดีของวัคซีน HPV

- ประสิทธิภาพสูง (ป้องกันไวรัส HPV ได้ 70-90%)
- ผลข้างเคียงน้อย (ปวด บวม คัน ไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน) หายได้เอง
- สามารถฉีดร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
- ป้องกันไวรัส HPV ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย



ไม่แนะนำให้ฉีดใน
สตรีตั้งครรภ์

หากพบว่าตั้งครรภ์หลังจากเริ่มฉีดวัคซีนไปแล้ว ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มถัดไปก่อน จนกว่าจะคลอด (สตรีที่ให้นมบุตรสามารถฉีดวัคซีน HPV ได้)